

LA  
BELGIQUE HORTICOLE,  
ANNALES  
DE BOTANIQUE ET D'HORTICULTURE,

PAR

ÉDOUARD MORREN,

Docteur en sciences naturelles, professeur ordinaire de botanique à l'Université de Liège,  
Directeur du Jardin botanique,  
Secrétaire de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique  
et de la Société royale d'horticulture de Liège; Membre de l'Académie royale des sciences, des lettres  
et des beaux-arts de Belgique, etc., etc.

---

1880.

---

LIÈGE,  
A LA DIRECTION GÉNÉRALE, BOVERIE 1.

12 à 18 pouces, fleuriront abondamment si on les pourvoit libéralement d'eau et de chaleur, pourvu qu'on les tienne près des vitres, en plein soleil, et elles produiront dans ces conditions des épis trois ou quatre fois plus longs qu'elles-mêmes.

Le fait que les deux premières fleurs, c'est-à-dire celles qui sont le plus proche de la tige, sont d'une autre couleur que les autres est généralement connu, mais la cause de cette différence n'est pas fort apparente et sous divers rapports n'est pas encore bien élucidée. Les longs épis pendants qui se balancent dans la végétation avoisinante peuvent, peut-être, comme les appendices des *Selinipedium*, *Cirrhopetalum*, *Uropedium* et des *Aristolochia* servir d'échelles à certains insectes aptères dont la présence pourrait être indispensable pour la pollinisation. Ces longs épis de fleurs jaunes ornées de taches rouge ponceau, se maintiennent frais pendant fort longtemps ; ils ont une beauté qui leur est propre et qui est bien distincte de celle des autres espèces du même genre. (*Traduit du Garden*, 18 oct. 1879, p. 354.) B.

Les **Cypripedium longifolium**, **Roezli**, **Hartwegi** et **Hinksianum** se ressemblent beaucoup, mais, suivant M. François Wiot, directeur de l'établissement Jacob-Makoy et C<sup>ie</sup>, à Liège, on pourrait les distinguer aux caractères différentiels suivants :

Le C. **LONGIFOLIUM** a les feuilles très longues, aiguës, vert foncé ; la hampe brune, les bractées vertes.

Le C. **ROEZLI** a les feuilles plus courtes, plus larges, vert foncé ; la hampe verte, les bractées vertes.

Le C. **HARTWEGI** a les feuilles de même forme et de mêmes dimensions que le **Roezli**, mais d'un vert pâle ; la hampe brune, les bractées rose foncé.

Le C. **HINKSIANUM** a les feuilles courtes ; la hampe verte, les bractées vertes et le sépale supérieur dressé.

**Les Glaïeuls de M. V. Lemoine.** — Parmi les nouveautés de la floriculture produites chez M. V. Lemoine, de Nancy, on remarque outre de nombreux *Fuchsias*, *Pentstemons*, *Pelargoniums*, *Delphiniums*, *Weigelas* et *Bégonias tubéreux*, deux Glaïeuls portant le nom de *Marie Lemoine* et celui de *M. Lemoine*. Ces deux hybrides sont issus d'un croisement du *Gl. purpureo-auratus* par une des variétés du *Gl. Gandavensis* : ils ont du premier, leur mère, la rusticité, la