

# FLORA ORIENTALIS

SIVE

ENUMERATIO PLANTARUM

IN ORIENTE

A GRÆCIA ET ÆGYPTO AD INDIÆ FINES

HUCUSQUE OBSERVATARUM

AUCTORE.

EDMOND BOISSIER

Soc. Phys. GENEV., Soc. LINN. LONDIN.

Reg. Acad. Scient., Matrit., etc., Sodali.

VOLUMEN QUINTUM

MONOCOTYLEDONEÆ

GYMNOSPERMÆ. ACOTYLEDONEÆ VASCULARES

GENEVÆ ET BASILEÆ

APUD H. GEORG, BIBLIOPOLAM.

LUGDUNI

APUD EUMDEM, 65, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

## TRIB. III ARETHUSEÆ.

## EPIPOGON. (Gmel. Sib. I, p. 41).

Perigonium resupinatum phyllis patentibus subæqualibus. Labello superum trilobum lobis lateralibus parvis patulis, medio multo majore indiviso concavo basi conice saccato. Gynostemium oblongum rectum antice prope basin stigmate tabulæformi prominulo obsitum apice bifidum. Anthera grandis apice cavo gynostemii recepta antice mucronata bilocularis. Pollinia duo candidulæ longis planis glandulæ triangulari supra stigma gynostemio adhærenti demum affixa. — Herba parasitica aphylla.

**1. E. aphyllum** (Sw. Summ. Veg. Scand. 1814, p. 32) rhizomate ramoso ramis coralloideis, caulis caruosulis aphyllis parce squamosis, floribus 2-7 laxe spicatis, perigonii flavescentis phyllis lanceo-lato-linearibus, labello albido purpureo-maculato lobo medio ovato margine crenulato et antice bilineatim papilloso 2. Ic. Fl. Dan. 1253. — Rchb. Germ. tab. 116. — Nees Germ. Gen. — *E. Gmelini* Rich. — *Satyrium epigogium* L. Sp. 1338.

Hab: in sylvis obscuris Fagi et Coniferarum parasiticum rarissime. In ditione ad latera montis Zivu Iberiae Caucasicæ (Steven ex M. B.).

Ar. Geogr. Scandinavia, Helvetia, Germania, Galliæ montes, Italia borealis, regio Danubialis, Rossia, Sibiria.

Obs. *Pogoniae* sp. (Sect. *Nervilia* Lindley).

Hab. in Affghania ad rivi Koussur margines (Griff. Journ. 75!), in Belutchia (Stocks 857!).

Folio deficiente hauc rite determinare nequeo; caulis pedalis vaginis subinflatis membranaceis apice oblique truncatis obsitus, spica laxiuscula 4-6-pollicaris, perigonii phylla elliptico-lanceolata acuta basi attenuata, labellum phyllis subæquilonsum secus lineam medium suberistatum rhomboideum trilobum lobo terminali sublongiore acutiore. Calcar tenue labello subbrevis. Affinis videtur *P. carinutæ* Wight Ic. tab. 1720 quæ calcare brevissimo, labello intus viloso, etc. differt.

## TRIB. IV. CYPRIPEDIEÆ.

## CYPRIPEDIUM (L. Gen. 1015).

Perigonii phylla patentia. Labellum magnum inflatum calceoliforme. Gynostemium cernuum apice trilobum lobis lateralibus brevioribus subtus antheriferis, medio petaloideo-dilatato oblongo. Antheræ loculis binis confluentibus univalves. Pollen granulis in

massam glatinosam conjunctis constans. Stigma deltoideum in gynostemii facie sub antheris. Ovarium non contortum. — Herbæ foliosæ rhizomate donatae.

1. C. **Calceolus** (L. Sp. 1846) rhizomate saepe elongato fibras numerosas edente, caule tereti pubescente polyphyllo, foliis magnis amplexicaulibus ovato-oblongis acuminatis pubescenti-scabris, flore saepius unico basi bracteato, perigonii brunneo-purpurascens phyllis quaternis lanceolatis acuminatis superiore binis connatis constante, labello luteo purpureo-picco, anthera stipitata inferne praeter lineam carinantem laevi ♀. Rchb. Germ. tab. 144.

Hab. in pratis, rupestribus, sylvis frondosis regionis montanae, Græcia in monte Velugo Ætoliae (Sprun.), Tauria et prov. Caucasicis (M. B., Hoh.). Fl. Octob.

Ar. Geogr. Europa media ab Angliâ, Scandinaviâ, Rossiâ mediâ ad Galliam, Helvetiam, Italiam borealem, regionem Danubialem, Sibiria tota.

## ORD. CXXXI. IRIDACEÆ.

(Lindl. Introd. 232. — *Irideæ* Juss. Gen. 57).

Flores hermaphroditæ regulares vel irregulares bracteati. Perigonum superum, corollum tubulosæ-sexfidum vel partitum laciniis æqualibus vel interioribus dissimilibus regularibus vel bilabiatis. Stamina tria basi laciniarum exteriorum perigonii inserta, antheræ biloculares extrorsum dehiscentes. Ovarium inferum vel rarius vertice exerto semistuperum triloculare vel rarissime uniloculare multi-ovulatum ovulis in angulo interiori loculorum vel in columnâ centrali 2-3-seriatis anatropis saepius horizontalibus. Stylus simplex brevissimus vel elongatus, stigmata tria simplicia, laciniata, vel petaloidea. Capsula membranacea vel coriacea trilocularis loculicidæ trivalvis valvis medio septiferis. Semina globosa vel angulata, testa membranacea vel carnoœ-incrassata, embryo rectus cylindraceus intra albumen carnosum vel corneum axillæ. — Herbæ rhizomatose vel bulbosæ.

TR. I. CROCEÆ. — Perigonum regulare laciniis internis exterioribus conniventibus, staminibus liberis æquilateralibus.

## CROCUS (L. Gen. 55).

Perigonum regulare infundibuliforme erectum tubo longissimo, limbi sexpariti lacinis oblongo-spathulatis conformibus, interioribus interdum minoribus. Stamina tria libera inclusa filamenlis rectis, antheris linearis-sagittatis. Stylus filiformis elongatus ex tubo perigonii