

QK1
.I31
1869
v.16

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL

DES SERRES ET DES JARDINS,

OU

CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE RAPPORT
ORNEMENTAL,

COMPRENANT

LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR ÉTYMOLOGIE, LEUR SYNONYMIE, LEUR
DESCRIPTION COMPARÉE, LEUR FIGURE, LEUR CULTURE, ETC., ETC.;

RÉDIGÉ PAR

CH. LEMAIRE,

Professeur de Botanique; Membre honoraire et correspondant de diverses Sociétés savantes,

ET PUBLIÉ PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT,

Horticulteur; Éditeur de la *Nouvelle Iconographie des Camellias*.

Seizième Volume. *Æ*

(OU SIXIÈME DE LA DEUXIÈME SÉRIE.)

Mo. Bot. Garden,

1893

GAND,

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE E. ET S. GYSELYNCK,

Rue des Peignes, 38.

—
1869.

Cypripedium Parishii (1). *Orchiaceæ* § *Cypripediæ*.

M. Hooker, fils, fait remarquer que la superbe espèce dont il s'agit appartient au groupe indien dont le *Cypripedium insigne* est le type, et a été longtemps le seul représentant connu, et renforcé maintenant par les *C. lævigatum* et *Stonei* (*Bot. Mag.* t. 5508. 5349), et celle dont il s'agit.

Elle a été découverte, en 1859, par le révérend C. Parish, dans les montagnes du Moulmein, et retrouvée par lui en 1866, époque à laquelle il en envoya à son jardin des individus, qui y fleurirent en 1867. Il en adressa un dessin et un beau spécimen séché, portant cinq fleurs à la fois, au Jardin botanique de Kew, et auquel M. Reichenbach donna le nom du découvreur. Le dessin du *Botanical Magazine* a été exécuté d'après un individu fleuri chez MM. Veitch, et dont le scape n'avait pas moins de deux pieds de long! Voici la description qu'en donne M. Hooker :

« Tige feuillée, de quatre à huit pouces de hauteur; feuilles coriaces, exactement LINÉAIRES (lege loriformes!), longues de huit pouces, sur deux de large! obliquement arrondies et bifides au sommet, d'un vert brillant. Scape d'un pied et demi à deux de hauteur, robuste, couvert de poils et trois-cinq-flores. Bractées amples, spathacées, ovées, aiguës, vertes. Ovaire et pédicelles longs de deux pouces, couverts de poils verts, mous. Sépales, d'un vert pâle, longs de deux pouces sur un demi de large (*V. la diagnose*). Pétales pendants, linéaires, tordus, longs de quatre à cinq pouces, pourpres à bords pâles dans les deux tiers de leur longueur inférieure; sommet arrondi; bords du tiers supérieur ondulés, verdâtres, portant çà et là des bouquets de poils pénicillés, très proéminents et pourprés. Labelle arrondi à la base, vert ou pourpré, long d'un pouce et demi. Gorge assez étalée, avec deux auricules dressées-aiguës. Staminode largement oblong, bifide, vert. » (*Parenth. nostr.*)

C'est une belle addition à un genre bien homogène, si favori dans les collections, et dont on connaît déjà bon nombre d'espèces.

(1) *C.* Foliis distichis loriformibus coriaceis apice obliquo obtuso v. bifido immaculatis; scapo elongato stricto pubescente 3-5-floro foliis multo longiore; bracteis late ovatis acutis ovario dimidio brevioribus; sepalis pallide viridibus lateralibus carinatis, dorsali late ovato subacuto; petalis sepalis 3-plo longioribus elongato-linearibus (subconcavis) tortis sordide purpureis basi viridibus penicillis ornatis, apicibus obtusis ciliatis; labello anguste oblongo basi rotundato ore paulo ampliato obliquo, auriculis subacutis prominulis; staminodio bifido.

Cypripedium Parishii REICHB. f. in *Flora*, 522. 1869. *Garden. Chron.* 824 (1869). cum ic. xilogr. J. D. HOOK. *Bot. Mag.* t. 5791. Septembre 1869.