

QK1
.131
1889
v.36

Principales distinctions obtenues par L'ILLUSTRATION HORTICOLE

MÉDAILLE DE MÉRITE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE EN 1873
DIPLOME D'HONNEUR A L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'AMSTERDAM EN 1877
MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1878
DIPLOME D'HONNEUR A L'EXPOSITION DE MADRID EN 1883

L'ILLUSTRATION HORTICOLE

REVUE MENSUELLE

DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES

DES

INTRODUCTIONS NOUVELLES

ET DES FAITS LES PLUS INTÉRESSANTS DE L'HORTICULTURE

DIRECTEUR

J. LINDEN

Administrateur


LUCIEN LINDEN

Rédacteur

ÉMILE RODIGAS

COLLABORATION DE BOTANISTES ET HORTICULTEURS ÉMINENTS



Mo. Bot. Garden, 
1893

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDERHAEGHEN, RUE DES CHAMPS

—
MDCCCLXXXIX



CYPRIPEDIUM BARBATUM LINDL. var. WARNERIANUM

PL. LXXXI

CYPRIPEDIUM BARBATUM LINDL. var. WARNERIANUM

CYPRIPÈDE BARBU DE WARNER

ORCHIDÉES

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES : Voir l'*Illustration Horticole*, tome II, pl. 64.CARACTÈRES SPÉCIFIQUES : *Cypripedium* acaule, foliis coriaceis acutis canaliculatis maculatis, scapo pubescente, sepalo dorsali cuspidato obtuso ciliato margine revoluta, petalis lineari-oblongis subundulatis fimbriatis margine superiore verrucoso, stamine sterili lunato pubescente.LINDL. *Bot. Reg.*, 1842, t. 17. — *Cypripedium javanicum* BL. *Cat.* 98. — *Flor. Ser.*, III, 1847, t. 190.

CARACTÈRES DE LA VARIÉTÉ : Planta brevior, foliis pallidioribus intensius maculatis. Flores colore insigni, sepalo superiore vitta purpurea arcuata distincto, petalis valde deflexis, labello rubro luteolo diluto.



écouvert au mont Ophir, détroit de Malacca, par CUMING, en 1840, le type de cette espèce fut envoyé aux célèbres horticulteurs LODDIGES, à Hackney, où il fleurit dès l'été suivant. BLUME l'avait signalé déjà auparavant dans l'île de Java. Les plantes importées vers cette époque de ces stations se répandirent promptement dans les collections européennes où leurs fleurs s'épanouissent en abondance au milieu de l'été. Elles sont grandes et belles, purpurines avec stries foncées, ont le pavillon blanc strié de lignes pourpres et le labelle en forme de casque et de couleur pourpre violacé. Les feuilles sont radicales, distiques, oblongues, aiguës, canaliculées, embrassantes à la base, richement marquées au dessus d'un réseau de bandes noirâtres sur un fond vert pâle. La tige florale s'élève à 0^m25 à 0^m30 de hauteur, elle est pubescente, pourpre foncé, généralement uniflore et porte une bractée verte cucullée plus courte que l'ovaire. Les pétales sont linéaires oblongs, très étalés, munis à la marge supérieure de verrues poilues pourpre noirâtre; les pétales sont d'une riche couleur violette. Tous les segments sont ciliés de poils noirs. Staminode en forme de fer à cheval.

Parmi les plantes directement importées il s'est nécessairement trouvé des variétés plus ou moins marquantes. De ce nombre est le *Cypripedium barbatum Warnerianum*, désigné également sous les noms de *C. barbatum Crossi*, *C. Crossi*, *C. barbatum biflorum* et *C. orbum*. C'est la plante représentée dans ce fascicule de l'*Illustration*. Cette variété se distingue de loin par des caractères bien saillants. La plante est plus trapue; les réticulations noirâtres des feuilles sont mieux définies; le coloris des fleurs est plus éclatant et la bande pourpre vineux du sépale supérieur est beaucoup plus nettement marquée; les pétales sont plus défléchis; les verrues sont moins nombreuses et enfin la coloration du labelle est différente. Un point à noter, c'est qu'elle fleurit deux mois plus tôt.

Une variété également fort distinguée est le *C. barbatum O'Brieni*.

Il en existe d'autres encore telles que *C. b. gracile*, *grandiflorum*, *majus*, *militare*, *nanum*, *nigrum*, *pictum*, *plumosum*, *pulcherrimum*, *purpuratum*, *superbum*, etc.; plusieurs proviennent sans doute des semis de plus en plus fréquents dans les cultures. Comme le fait remarquer le *Manual of Orchidaceous Plants*, Part IV, *Cypripedium*, p. 13, le *C. barbatum* a servi d'élément prépondérant dans un grand nombre d'hybridations entre espèces voisines et a donné lieu à des formes très variées.

ÉM. R.