

LINDENIA
ICONOGRAPHIE
DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

DIRIGÉE PAR LUCIEN LINDEN

14^{me} VOLUME
4^{me} DE LA SECONDE SÉRIE

1898

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.




CYPRIPEDIUM × HAUMONTI L. LIND.

PL. DCLXVIII

CYPRIPEDIUM × HAUMONTI L. LIND.

CYPRIPEDIUM DE M. HAUMONT

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, I, p. 17.*Cypripedium* × *Haumonti*. Hybridum inter *C.* × *Harrisianum* et *C.* × *Crossianum* (?) artificiosa fecundatione creatum.*Cypripedium* × *Haumonti* L. LIND., infra.

e nouvel hybride a fait son apparition il y a quelques mois dans les serres de L'HORTICOLE COLONIALE, au Parc Léopold, Bruxelles. Les graines, semées il y a cinq ans et demi, avaient été recueillies sur le *C.* × *Harrisianum*, et nous croyons, sans pouvoir absolument l'affirmer, un numéro ayant été effacé, que l'autre parent était le *C.* × *Crossianum*.

Ce dernier, qui ne doit pas être confondu avec le *C. barbatum* var. *Crossianum*, que l'on désigne parfois trop brièvement sous le nom de *C. Crossianum*, est un hybride du *C. venustum* et du *C. insigne*. On pourra d'ailleurs consulter son portrait dans *L'illustration Horticole* de 1898.

Il nous semble bien d'ailleurs que l'aspect du semis confirme cette origine indiquée par nos souvenirs. La fleur rappelle assez divers hybrides du *C. venustum*, à la première ou à la seconde génération. Le coloris du pavillon, notamment, est caractéristique ; l'ensemble est jaune verdâtre clair, légèrement bordé de blanc sur tout le contour, avec de nombreuses lignes longitudinales rouge pourpre s'élevant jusqu'à la moitié de la hauteur environ, et se prolongeant en vert foncé. La ligne médiane est plus foncée et va presque jusqu'au sommet. Les pétales, d'une largeur moyenne, faiblement incurvés, sont d'un rouge un peu jaunâtre ; la moitié supérieure est d'un rouge plus vif, et relevé de stries longitudinales foncées. Le sabot assez volumineux, mais régulièrement rétréci vers le sommet, est coloré en avant d'un rouge foncé brunâtre. Le feuillage n'est pas sensiblement réticulé, et en cela il rappelle plutôt celui du *C.* × *Crossianum*.

Il serait intéressant de comparer cet hybride au *C.* × *Boyleanum*, que nous trouvons signalé dans les listes d'hybrides comme ayant la même parenté que celui dont nous nous occupons ici ; toutefois nous n'avons pu trouver aucun renseignement sur le *C.* × *Boyleanum*.

Le *C.* × *Crossianum* n'a donné jusqu'ici aucun autre hybride, à notre connaissance ; il n'est d'ailleurs pas commun dans les collections.

Quant au *C.* × *Harrisianum*, il a déjà produit beaucoup d'hybrides, parmi

lesquels plusieurs ont une réputation justifiée. Un certain nombre, qui portent des noms différents, sont issus de croisements identiques; les croisements *Harrisianum* × *insigne* et *Harrisianum* × *Spicerianum*, notamment, ont été reproduits bon nombre de fois.

Le pedigree de notre hybride est en somme le suivant :

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2} \text{ Harrisianum} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{4} \text{ barbatum} \\ \frac{1}{4} \text{ villosum.} \end{array} \right. \\ \\ \frac{1}{2} \text{ Crossianum} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{4} \text{ venustum} \\ \frac{1}{4} \text{ insigne.} \end{array} \right. \end{array}$$

