

CYPRIPEDIUM

SELENIPEDIUM & UROPEDIUM

MONOGRAPHIE

COMPRENANT

LA DESCRIPTION DE TOUTES LES ESPÈCES, VARIÉTÉS
ET HYBRIDES EXISTANT JUSQU'À CE JOUR

PAR

F. DESBOIS

HORTICULTEUR A AUDERGHEM
CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE LIÈGE
ET DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DE LILLE

AVEC FIGURES

GAND

IMPRIMERIE F. MEYER-VAN LOO, RUE DE FLANDRE, 66

—
1898

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

CYPRIPEDIUM INSIGNE *var.* HALLIANUM.

Cette variété a été trouvée chez M. HALL, de Londres, et elle porte son nom. Le feuillage est très étroit et mince. Il est dans le genre du *C. insigne Maulei*. Les parties florales sont toutes étroites. Le sépale supérieur a un long disque verdâtre avec de belles taches chocolat brun : on trouve les mêmes bandes sur la partie inférieure du sépale qui est vert clair. Les bords et le sommet du sépale supérieur sont blancs. Les pétales sont recouverts d'une belle teinte mauve rougeâtre, excepté aux bords qui sont de couleur ocre, avec de nombreux points chocolat brun jusqu'au sommet. Le labelle est mince, jaune clair avec de nombreuses lignes de très petites taches noires à la base, la partie antérieure est brunâtre, et il y a des réticulations brunes à l'intérieur des cornes latérales du sac antérieur. Cette variété peut se comparer avec les *C. insigne Horsmanianum* et *nitens*, mais elle en diffère tout à fait par ses pétales tachetés.

Lindenia IV, p. 98 Cat. Seeger et Tropp. 1889 Pucci, 1891, p. 114.

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* HARDYANUM.

Belle forme jaune clair; la moitié du sépale dorsal vers le haut est blanche et ressemble au *C. insigne Sanderæ*. Trouvé chez M. E. HARDY, Tyntesfield, Ashton on Mersey.

Gardn. chr. 27 octobre 1894.

CYPRIPEDIUM INSIGNE.

var. HOLZHAUSENIANUM F. Desb.

Sépale dorsal très large, arrondi, fortement ponctué de grosses macules noir sèpia, bordé blanc vers les $\frac{2}{3}$ supé-

rieurs; sépale inférieur vert clair, fortement maculé de points en ligne. Pétales fond cinabre, réticulés acajou brun. Labelle gros, marron foncé, bordé jaune à l'orifice. Staminode large, spatulé, jaune ocre, marqué au centre d'un mamelon jaune de chrôme. Belle variété trouvée chez M. MADOUX en 1897 à Auderghem-lez-Bruxelles.

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* HIMALAÏCUM.

Variété trouvée à la base des monts Himalaya. Introduit par M SANDER, de St.-Albans.

CYPRIPEDIUM INSIGNE.

var. HORSMANIANUM. *Rchb. f.*

Variété très élégante trouvée chez M. HORSMAN, de Colchester, dont elle porte le nom. Son caractère général est d'être court, mais pas trop. Le sépale dorsal est émoussé, cunéiforme-oblong; toute la partie supérieure est complètement blanche, celle inférieure, comme le reste de la fleur, a les couleurs habituelles. Le sépale inférieur est étroit, oblong, ligulé et acuté. Les pétales sont dirigés en avant et sont larges au sommet. Le labelle est remarquable; il a un bec dans le milieu de la bouche et les divisions latérales sont plutôt petites.

Gard. chr. 1888 1. p. 693. Pucci. 1891. p. 114.

CYPRIPEDIUM INSIGNE. *var.* ILLUSTRÉ.

Très belle forme du *C. insigne* qui s'est montrée chez M. R. MEASURES, de Cambridge Lodge. Fond jaune clair.