

CYPRIPEDIUM

SELENIPEDIUM & UROPEDIUM

MONOGRAPHIE

COMPRENANT

LA DESCRIPTION DE TOUTES LES ESPÈCES, VARIÉTÉS
ET HYBRIDES EXISTANT JUSQU'À CE JOUR

PAR

F. DESBOIS

HORTICULTEUR A AUDERGHEM
CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE LIÈGE
ET DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DE LILLE

AVEC FIGURES

GAND

IMPRIMERIE F. MEYER-VAN LOO, RUE DE FLANDRE, 66

1898

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

CYPRIPEDIUM VOLONTEANUM *var.* GIGANTEUM.

Une forme massive de beaucoup la meilleure de sa classe introduite par M. M. HUGH LOW, à Clapton.

Gard. chron. 1893, I. p. 641. Orch. Rev. I. p. 253. voir C. Hookeræ volonteantum giganteum.

CYPRIPEDIUM VOLONTEANUM *var.* LOWI.

Coloris plus foncé que le type, voir *C. Hookeræ volonteantum*.

CYPRIPEDIUM WALLAERTIANUM.

Issu du *C. Harrisianum* et du *C. villosum* exposé au Meeting du 23 août 1892 à la Société Royale d'Horticulture de Londres par M. M. PITCHER & MANDA.

Gard. chr. 1892, II. C. Wallaertianum, id. 1895, II. p. 655.

CYPRIPEDIUM WALTERSIANUM. *D^r Kränzlin*.

Feuilles vert brillant au-dessus avec des hiéroglyphes et des tessellations un peu plus foncées. Scape de 30 cent. environ brunâtre et couvert de poils gris ; bractée différente en grandeur et beaucoup plus courte que l'ovaire brun pourpré. Sépale dorsal ovale-acuté un peu en forme de casque. La forme de ce sépale représente un type tout à fait nouveau dans les *Cypridium*. Le couleur est d'un très beau vert avec un large bord blanc ; sépale inférieur vert blanchâtre pâle de moitié aussi long que la lèvre. Les pétales ont une grande ressemblance pour la forme et l'apparence avec

ceux du *C. Lowii*, mais la couleur de la base est toute différente; on n'y trouve pas les larges taches noir pourpre du *C. Lowii*, mais sur le bord supérieur, on voit des verrues brunâtres comme dans le *C. barbatum* mais sans poils et de nombreux points pourpré; la moitié inférieure est vert brillant sans aucune marque. Labelle plutôt large, bords convergents à la base avec de petites verrues luisantes et les lobes latéraux très aigus. Couleur générale brun pourpre plus pâle en arrière et en bas avec quantité de petits points pourpre. La colonne a un staminode tout à fait différent du *C. Lowii*, oblong-obcordé avec une dent dans le sinus mais sans la corne dressée et poilue du *C. Lowii*, il est vert avec un bord blanc. Fleur sans poils ni cils, tout à fait glabre. C'est peut-être un hybride naturel entre le *C. Lowii* et un autre espèce inconnue. On connaît l'habitat de cette espèce, mais on ne le fait pas savoir pour le moment, ce n'est pas le pays dont le *C. Lowii* est originaire. La plante a fleuri chez M. WALTERS, de Magdebourg, elle était assez mauvaise, il faut espérer qu'en devenant plus vigoureuse les fleurs gagneront en beauté.

Gardn. chron. 1895, I. p. 166. Orch. Rev. 1895, p. 83.

CYPRIPEDIUM WARNERO-SUPERBIENS.

Plante intermédiaire entre les deux parents; feuillage long, acuté, large près de la base, réticulé vert foncé sur un scape brun, pubescent. Sépale dorsal large, blanc avec des nervures vertes et une teinte de rouge vineux sur le centre; sépale inférieur plus petit de même couleur. Pétales étroits, blancs, teintés de rouge vineux aux extrémités et tout à fait veinés de vert, ciliés et verruqueux sur les bords, ayant quelquefois une tache sur la surface et quelques points brun près de la base. Le labelle est d'une riche couleur brun luisant, légèrement concave en avant au-dessous de