

LINNÆA.

Ein

**Journal für die Botanik
in ihrem ganzen Umfange.**

Zweiundzwanzigster Band.

Oder:

**B e i t r ä g e
zur**

Pflanzenkunde.

Sechster Band.

Herausgegeben

von

D. F. L. von Schlechtendal,
der Med., Chir. u. Philos. Dr., ordentl. Prof. an der Universität zu Halle
und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Mit fünf Tafeln Abbildungen.

Halle a. d. S. 1849.

gedruckt auf Kosten des Herausgebers.

In Commission bei C. A. Schwetschke und Sohn.

fo. = folio oder foliis.

gy. = gynostemio.

lb. = labello.

ped. = pedunculo.

p. ph. = perigonii phyllo oder phyllis.

p. ph. e. = perigonii phyllis externis.

p. ph. i. = perigonii phyllis lateralibus internis.

r. = racemo.

sp. = spica oder spicis.

Cypripedium (Acaulia) Klotzscheanum pedunculo subtereti, basi nunc unifoliato, puberulo, squamato, squamis supremis oblongis, obtusis, apice 2 — 3 - floro, bracteis ovatis, acutis, cucullatis, p. ph. supremo lanceolato acutiusculo, extus pubescente, lateralibus externis coalitis latioribus, caeterum aequalibus p. ph. i. lanceolatis apice valde attenuatis, margine undulatis, externis tertia parte longioribus, lb. ovato contracto, ore subovali, stamine sterili trilobo, lobo medio acuto, lateralibus transversis, rhombeis puberulis.

Blätter lederartig, lineallanzettlich, fein zweispitzig, über fusslang. Blüthenstiel bis 15" hoch. Blüthen so gross, wie bei *C. Lindleyanum*. Das verwandte *C. vittatum Arrabida* IX. t. 62 hat viel längere Deckblätter, äusserlich kahle Blüthen. Die Längenverhältnisse der Blüthendecken und die sterilen Antheren sind ganz verschieden.

Brittisches Guiana. R. Schomburgk.

Habenaria modestissima sp. subremotiflora, bracteis lanceolatis acutis, p. ph. e. supremo ovato, lateralibus oblongis, acutis, aliquid falcatis, p. ph. i. bipartitis, prope aequilongis, partitione anteriore linearie acuta falcata, posteriore lanceolata, acuta, aliquid brevior et latiore, lb. tripartito,