

GENERA ET SPECIES
ORCHIDEARUM NOVARUM

QUAS

COLLEGIT, DESCRIPSIT ET ICONIBUS ILLUSTRAVIT

J. BARBOSA RODRIGUES

Secr. et Prof. Adj. in Imp. Colleg. P. II., Soc. Inst. Hist. Geog. Bras.,
Soc. honorarius Reg. Soc. Anthropol. et Ethn. Florentin. et Societ. Acclimationis
et Vellosianæ (naturalistarum) Rio de Jan.,
Conditor Societ. Ethnogr. Santarem;
Auctor oper. *Sertum palmarum, Naturam Brasiliæ Septentrionalis*
investigandi munere commissus, etc., etc.

I

SEBASTIANOPOLIS

MDCCCLXXVII

CYPRIPEDIUM Lin.

1. **C. Paulistanum** BARB. ROD. *l. cit. tab. 454.*

C. acaule, foliis 6-contemporaneis, distichis, coriaceis, linear-ligulatis, semi-tortis; scapo erecto, pubescente, bracteis lanceolatis tecto; superioribus latioribus et majoribus quam ovarium; sepalo superiore semi-convexo, linear-lanceolato, cum marginibus undulatis, patente, inferioribus labelli longitudine, concavis, obtusis; petalis sub-duplo majoribus sepalis, linearibus, acutis, undulatis cum basi marginibusque interne pubescentibus, pendulis; labello calceolare, oblongo, in basi internè pubescente; gynostemio pubescente, stamine sterili lanceolato, in marginibus pubescente in posteriore latere.

HAB. *Croissant sur l'humus amoncelé dans les fentes des roches de la serra du Cajuru, province de S. Paulo. Fleurit au mois de Mars. Regnell. III. 1202.*

Cette espèce est très-voisine du *Selenipedium vittatum* RICH. FIL., le *Cypripedium vittatum* de Velloso, par le facies, mais s'éloigne de celui-ci par la forme du labelle, dont les bords ne sont pas soudés à l'intérieur, par les sépales inférieurs qui sont aussi longues que le labelle et par le gynostème, dont le stamen stérile et le stigmate sont très-différents.

