

SYNOPSIS

PLANTARUM PHANEROGAMICARUM NOVARUM

OMNIUM

PER ANNOS 1846 & 1847 DESCRIPTARUM.

AUCTORE

GUILIELMO GERARDO WALPERS,

PHILOSOPHIAE DOCTORE, BOTANICO IN UNIVERSITATE REGIA FRIEDERICA GUILIELMA BEROLINENSI PRIVATIM DOCENTE, ACADEMIAE CAESARAE LEOPOLDINAE CAROLINAE NATURÆ CURIOSORUM, SOCIETATIS REGIAE BAVARICÆ BOTANICÆ RATHSBERGENSIS, SOCIETATIS SILESIACAE CULTURÆ PATRIÆ STUDIOSAE SODALI, REL.

TOMUS I.

ADJECTUS EST INDEX ORDINUM, SUBORDINUM, GENERUM, SECTIONUM,
SPECIERUM ET SYNONYMORUM OMNIUM OBVIORUM.

LIPSIAE.

SUMTIBUS FRIDERICI HOFMEISTER.

1848 — 1849.

Hujus subordinis:

ORCHIDEA ? Schlecht. Linnæa XX: 573. — Ex vagina brevi hyalina truncata exsurgit caulis cum folio lineari subbipinnari sparse piloso, 3½ poll. altus uniflorus, unica vagina (praeter floralem) patula nec nisi ima basi vaginante foliiforme 4 lin. longa supra medium instructus, superne pilis brevibus crispulis (viscidulis?) adspersus. Perigonii phylla 5 subaequalla bilabiatim disposita pilis glandulisque minatis extus instructa, quod indumentum in ovario densum. Labellum facie glanduloso-pilosum cum columnæ alis inferne connatum breve, apice inciso-fimbriatum seu dentatum. Anthera terminalis mucronata. Pollen pulveraceum. — Crescit in Nova Hollandia prope Bethaniam.

Subordo VII. CYPRIPEDIEAE.

1616. CYPRIPEDIUM Linn.

(L. O. p. 525.)

Foliosa.

1. C. CORDIGERUM Don. — Dcne. in Jacquem. Voyage IV. 163. t. 166.
2. C. IRAPEANUM Llaw. & Lex. — Bot. Reg. 1846. t. 58. — Van Houtte, Flora der Gwchhsr. III. t. 186.

Acaulia.

3. C. HUMILE Willd. — Ann. de la soc. d'hortic. de Gand II. 323. t. 80.
4. C. VENUSTUM — Phrad. Vindob. fasc. IV.
5. C. BARBATUM Lindl. — Van Houtte, Fl. d. Gwchhsr. III. t. 190. — B. Mag. t. 3234.
6. C. INSIGNE
7. C. PURPURATUM } Paradis. Vindob. fasc. I.

Subclassis V.

SCITAMINEAE Linn.

(Meisn. Génér. plant. vascul. I. 387. II. 290.)

Ordo CCXLI. ZINGIBERACEAE L. C. Rich.

(Endl. Gen. pl. p. 221. et Suppl. II. p. 22. — Meisn. Gen. pl. vascul. I. 388. II. 290.)

1624. KAEMPIFERIA Linn.

(Linn. Gen. pl. no. 7.)

1. * K. GALANGA Linn. Spec. pl. pag. 3. — Wght. Icon. plant. t. 899.

1026. AMOMUM Linn.

(Linn. Gen. pl. no. 2. [excl. sp.])

1. A. VITELLINUM Lindl. Journ. of the hortic. soc. II. 245. — B. Regist. 1847. t. 52. — Caulescens glabrum: foliis ovalibus; spica oblonga sessili laxiuscula; labello oblongo obtuso dentato; antherae appendice petaloidea tripartita, lacinias undulatis laceris, intermedia duplo majore. 2½ — Crescit in India orientali.

1628. DONACODES Blume.

(Blume, Enumer. plant. Javan. I. 54.)

1. D. MACROCEPHALA Zollinger, Flora (B. Z.) 1847. p. 758. — Foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi obtusis, supra glabris, subtus arachnoideo-pubescentibus; vagina villosa superne emarginata; spicis pedunculatis dense imbricatis ovatis elongatis; bracteis late ovatis rotundatis mucronulatis. 2½ — Crescit in sylvis humidis Javae planithei austro-orientalis.

ANNALES **BOTANICES SYSTEMATICAE.**

AUCTORE

GUILIELMO GERARDO WALPERS.

TOMUS III.

LIPSIAE.

SUMTICUS AMBROSII AREL.

1852 — 1853.

subhyalino-denticulatis; scapo hirsuto-pubescente purpurascens; bractea ovario virgineo dimidiata breviore spica 3-dentata; stamine sterili magno lunato; sepalis labelli duas tertias sequentes extus hirsuto-pubescentes, antice lanceolatae spira obscure bidentata labello breviore albo-viridescente, postice latius ovato acuminateissimo, basi virgineo albo, inter viridibus et purpureis percurso; petalis oblongis glabris, obtuso et falcate-subacumiosis subundulatis glanduloso-ciliatis purpureis, extus viridescentibus, intus versus basin saturate purpureo-punctatis; labelli oblongi inflati ore lateribus inflexo et utrinque lobo obtuso erecto aucto, extus hepatico-purpureo, subbas vireacente, intus purpureo, lineis et punctis saturationibus more Digitalis purpureae notato. — Sepalum dorsale 1 $\frac{1}{2}$ poll. longum, 1 $\frac{1}{2}$ poll. latum Petala 2 $\frac{1}{2}$, poll. longa, $\frac{1}{2}$ poll. lata. Labello ventricosum 2 $\frac{1}{2}$, poll. longum. — Specie pulcherrima sola, ut videtur, hucusque in China reperta; C. purpurea Lindl. arctissime videtur propinqua, quod autem nec ex charactere nec ex figura Cl. Wight (Icon. Pl. Indise orient.) dignoscendi potest. — Habitat in insula Hongkong.

+ Icones addendae.

CALCEOLUS

CALCEOLUS 16130 obv.

- C. CALCEOLUS Huds. — Rehb. fil. Orch. Eur. t. 164.
 C. GUTTATUM Sw. a. vulgare Rehb. fil. I. c. t. 164. b. Redouté — Rehb. fil. I. c. p. 166. t. 168. — Van Houtte, Flore des serres VI. 131. + t. 573. Inde: Pers. & Lindl. Flow. gard. I. 183. fig. 112.
 C. MACRANTHOS Sw.
 a. vulgare Rehb. fil. I. c. t. 164.
 b. ventricosum Rehb. fil. I. c. t. 145.
 C. SPECTABILE Sw. — Van Houtte, Flore des serres V. 430.

VENUSTA

- C. CAUDATUM Lindl. — Pers. & Lindl. Flow. gard. I. 37. tab. 9. & p. 40. (a. ic. zylogr.) — Van Houtte, Flore des serres VI. 99. t. 568.
 C. LOWII Lindl. — Van Houtte I. c. IV. 375. — Morren, Ann. de la soc. d'agric. de Gand IV. 175. t. 193.
 C. VENUSTUM Wall. — Rehb. fil. Orch. Eur. I. 4. fig. 37—41.

16131. *UROPEPHIUM* Lindl.

(Orch. Linden. p. 28)

- I. U. LINNEI Lindl. — A. Bronn. Ann. sc. nat. (3. Sér.) XII. 113. + t. 2. — Van Houtte, Flore des serres V. p. 123. c. ic. zylogr.

1612½. BIRTHBORCHS Stone. See illustration
(L. 482).

1. **V. ALTISSIMA** Blume. (*Hemimallotis altissima*) Blume, Rumphie IV. tab. 2002. —
Fructus ac s... — *Icoa altidissima*.
1614. VANILLA Sw.
(L.O. 434. — Rchb. fil. in Wlpra. Ann. I. 810.)

Monographiam cf.: Morer, Bull. de l'acad. de Bruxelles XVII. I. 108. sqq.

Subordo VII. CYPRIPEDIAE.

1618. **CYPRIOPEDIUM** Link.
(L. 325. — Rehb. fil. in Wipr. Ann. I. 890.)

1. C. ALBIZZETTI. NUM. 1000. M. LINNÆUS XXII. p. 111. — Pedunculus subtortus, basi lato
unifoliato puberulo, squamato, squamis supremis oblongis obtusis, apice 2-3-foro:
bracteis ovatis acutis coryfoliatis; perigenio phyllo supremo lanceolato acuminato, ex-
tus pubescente, lateralibus externis coartatis laevioribus, caeterum aequalibus, perigenio
phyllis lateralibus internis lanceolatis, apice valde attenuatis, margine undulatis, ex-
ternis tercia parte longioribus; labello ovato contracto, ore subovali; stamine sterili
trilobo, lobo medio acuto, lateralibus transversis rhombicis puberulis. — Habitat in
Guiana Britannica.

* C. CARICINUM Lindl. in Paxt. Flav. gard. I. p. 39. — Foli a angustissimis coriaceis acnis unicoloratis, scapi tomentosi longitudine; racemo plurifloro; bracteis ovatis spatheatis glabris, ovario glabro brevioribus; sepalis lateralibus concavis labello longitudo; petalis in cunctam acuminateis. — Habitat in Bolivia.

3. *C. GLANDULIFERUM* Blume, *Rumphia* IV. p. 56. et tab. 195. fig. 2. (omine t. insigne) et tab. 196. — *Acaule*: foliis coriaceis rigidis linearibus obtusis, basi canaliculatis; scapo pubescente subbiforo; perigonii phyllo dorsali oblongo-lanceolato acuminato, margine saepo revoluto, interioribus linearibus acuminatissimis undulatis, ad margines inferne glanduloso-barbatis; stamine sterilis fornicate, antice in rostrum protracto puberulo. — *Blum.* *Cent. Plant. nov.* alt. — Habitat in sylvis Novae Guineae in vetustis præridibique arborum trunci. — *C. insigne* Wall. affine, sed phyllis perigonii interioribus multo angustioribus acuminatissimis et stamine sterilis alter constituto ab eo abunde diff. — *Alia species*, *C. Javanicum* Reichenb., est vir à *C. venusta* Wall. distin-
tiva videntur.

4. C. SINICUM Hance, Pl. nov. austro-chin. ined. fasc. II, p. 1. (Char. ref. et ampl. ex europaea spec. viv.) — Acaule dodrantale: foliis radicalibus basi ruginante glanduloso - ciliatis subcarneolo-coriaceis oblongo apice 2-3-dentata striatis, medio canaliculatis, supra-tristeo-viridibus, maculis atro-viridibus notatis, subtus pallidis concoloribus, marginibus intumescim.