QK1
.I31
1873
v. 20

L'ILLUSTRATION HORTICOLE

REVUE MENSUELLE

DES SERRES ET DES JARDINS

COMPRENANT

LA FIGURE, LA DESCRIPTION, L'HISTOIRE ET LA CULTURE DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES, LES INTRODUCTIONS NOUVELLES; LA CHRONIQUE HORTICOLE, LES VOYAGES BOTANIQUES, LE COMPTE-RENDU DES GRANDES EXPOSITIONS ET DES OUVRAGES NOUVEAUX SUR LA BOTANIQUE ET L'HORTICULTURE, ETC., ETC.;

publiée sous la direction de

J. LINDEN

et rédigée par

ED. ANDRÉ

AVEC LA COLLABORATION DE PLUSIEURS BOTANISTES ET HORTICULTEURS.

Mo. Bot. Garden,
1893

Vingtième Volume.

(OU QUATRIÈME DE LA TROISIÈME SÉRIE.)

GAND.

1873.

P. De Pannemaeker ad nat. pinx. in Horto Lind.

Étab. Lith. de P. De Pannemaeker à Gand.

copyright reserved

Pl. CXXXVIII.

CYPRIPEDIUM ROEZLI, REGEL.

CYPRIPÈDE DE ROEZL.

ORCHIDÉES.

ÉTYMOLOGIE et CARACTÈRES GÉNÉRIQUES : Voir *Illustr. hortic.*, vol. II, p. 64.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES : caulescens, glaberrimum; *caulis* 10-12 c. altus, complanatus, foliorum basibus vaginantibus involutus; *folia* disticha, loriformia, acuta, basi vaginata carinata, a medio ad apicem planiuscula, circiter 40 cm. longa et 4 cm. lata, lævissima; pedunculus terminalis foliis paulo brevior, glaber, apice 1-pluriflorus; *bracteæ* complicatæ, ancipites, pedunculum involventes, lineari-lanceolatæ, acutæ, glaberrimæ; *ovaria* glaberrima, triangulo-teretiuscula; *sepala* difformia; *sepalum supremum* e basi latiore lanceolato-attenuatum, obtusiusculum, margine undulatum, circiter 5 cm. longum et 1½ cm. latum; *sepalum inferius* duplo latius, brevius e basi late ovata paulo attenuatum, obtusum, circiter 4½ cm. longum et 3 cm. latum, *sepalum utrumque* a carneo purpurascens, nervis saturioribus percursum; *petala* e basi lanceolata longe acuminato-attenuata, vix spiraliter torta, sepalis longiora, circiter 9 cm. longa, basi circiter 8 cm. lata, medio viridi-lutescentes, margine purpurascentes; *labellum* flavescens, circa calcem oblongum purpurascens, circiter 4 cm. longum; *stamen* sterile a basi cuneata rhomboideum, margine basim versus purpureo-hirtulum.

Cypripedium Roezli, Regel, *Gartenflora*, t. 754, p. 97, 1873.
Selenipedium Roezli, Rchb. f. *Gartenfl.*, 1871, p. 164.

Ce beau Cypripède a été découvert, en 1871, par M. Roezl, l'intrépide voyageur, sur les bords acccidentés du Rio Dagua (Nouvelle-Grenade), sur le versant ouest de la Cordillière centrale. Ce n'est plus une espèce cespiteuse, formant des touffes compactes d'où se détachent les sabots des labelles pendants au sommet de leur hampe. C'est une plante caulescente, élevée, ornée de feuilles de 3 pieds de longueur et d'une hampe de 2 à 3 pieds de haut, au sommet de laquelle peuvent s'étager jusqu'à 20 fleurs roses pourprées striées et jaunâtres. Le premier pied qui ait effectué sa floraison en Europe s'est épanoui à St-Pétersbourg en janvier de cette année sur l'un des premiers exemplaires, encore bien faibles, expédiés vivants en Europe par M. Roezl.

Depuis, la plante a été introduite chez M. Linden, qui en possède de nombreux exemplaires d'une vigueur extrême et dans des conditions parfaites de culture. Leurs feuilles, comprimées et carénées à la base embrassante, sont planes plus haut et se terminent au sommet par trois petites dents, caractère que nous n'avons pas vu indiqué par M. Regel.

Chacun voudra bientôt admirer, sur ce robuste feuillage, les belles fleurs à longues divisions roses et purpurines mêlées de jaune et de vert, qui prêtent à cette belle espèce un caractère si étrange et si beau à la fois.

La station naturelle de l'espèce, le Rio Dagua, indique la serre chaude humide, comme les autres Orchidées et Aroïdées de la région, notamment le magnifique *Philodendron Daguense*, dont nous avons décrit naguère la végétation et les belles fleurs. ED. A.