QK1
.I31
1879
v.26

L'ILLUSTRATION HORTICOLE

REVUE MENSUELLE

DES SERRES ET DES JARDINS

COMPRENANT

LA FIGURE, LA DESCRIPTION

L'HISTOIRE ET LA CULTURE DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES

LES INTRODUCTIONS NOUVELLES

LA CHRONIQUE HORTICOLE, LES EXPLORATIONS BOTANIQUES

LE COMTE-RENDU DES GRANDES EXPOSITIONS

ET DES

OUVRAGES NOUVEAUX SUR LA BOTANIQUE ET L'HORTICULTURE, ETC.

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

J. LINDEN

ET RÉDIGÉE PAR

ÉD. ANDRÉ

AVEC LA

COLLABORATION DE PLUSIEURS BOTANISTES ET HORTICULTEURS

VINGT-SIXIÈME VOLUME

OU DIXIÈME DE LA TROISIÈME SÉRIE

Mo. Bot. Garden.
1893

GAND

CHEZ L'ÉDITEUR EUGÈNE VANDERHAEGHEN, RUE DES CHAMPS, 66

—

1879

CYPRIPEDIUM BOXALLII, REICH. FIL.

P. De Pannemaeker, ad nat. pinx. in Horto Lind.

J. Linden, publ.

copyright reserved

Pl. CCCXLV.

CYPRIPEDIUM BOXALLII, REICH. FIL.

CYPRIPÈDE DE BOXALL.

ORCHIDÉES.

ÉTYMOLOGIE et CARACTÈRES GÉNÉRIQUES : Voir *Illustr. hort.*, II, pl. 64.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES : *caulis* obscurus marmoratus, pilis pellucidis nigro annulatis; *bractea* ampla lata, summi sepali quartam inferiorem tegens; *sepal.* utrumque bene obtusum, utrumque basi latiusculum; *petala* basi vix cuneata; *labelli* cornua lateralia abbreviata; *staminodium* basi angustum. Asia tropica.

Cypripedium Boxallii, Reich. fil. in *Gard. Chron.*, 1877, p. 367 (new ser. vol. VII).

Le *Cypripedium Boxallii* est une espèce assez voisine du *C. villosum*, Lindl., dont il diffère par plusieurs points. La bractée est beaucoup plus grande; elle couvre le quart de la base du sépale supérieur, elle est aussi beaucoup plus large. Le pédoncule est couvert de taches foncées, que l'on ne voit jamais sur le *C. villosum*, et les poils ont des cellules alternativement translucides et un peu noirâtres. Les deux sépales sont beaucoup plus larges à leur base, tout à fait obtus, tandis que le sépale inférieur du *C. villosum* est très aigu. Les pétales sont beaucoup moins cunéiformes. Le labelle ne présente pas les longues cornes latérales du *villosum*, et le staminode est plus étroit à la base. Telles sont les différences que M. Reichenbach a fait valoir récemment en décrivant la plante.

Nous ignorons s'il s'agit bien là d'une espèce très distincte, le polymorphisme des orchidées de ce genre offrant parfois des différences dans les variétés d'une même espèce qui semblent même plus accusées que celles que nous venons de constater. Mais, espèce distincte ou variété du *C. villosum*, la plante que nous figurons n'est pas moins recommandable au point de vue horticole.

L'introduction du *C. Boxallii* en Angleterre, d'où il a passé sur le continent, est due à M. Boxall, habile collecteur anglais; il a découvert la plante dans une localité de l'Asie tropicale qu'il n'a pas fait connaître, mais que nous pensons être quelqu'une des possessions anglaises dans l'Inde.

ED. ANDRÉ.