

LINDENIA  
ICONOGRAPHIE  
DES ORCHIDÉES

---

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

---

DIRIGÉE PAR LUCIEN LINDEN

---

14<sup>me</sup> VOLUME  
4<sup>me</sup> DE LA SECONDE SÉRIE

---

1898

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.



CYPRIPEDIUM PARISHI RCHB. F.

PL. DCLXX

## CYPRIPEDIUM PARISHI RCHB. F.

CYPRIPEDIUM DU RÉVÉREND PARISH

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, I, p. 17.

*Cypripedium Parishii*. Folia latissime lorata apice inaequali bilobo, recurva; pedunculus velutinus puberulus quinqueflorus secundiflorus; bracteae vaginatae spathaceae, obtusae ovario pedicellato, velutino piloso breviores; sepalum dorsale, cuneato-ovatum acutum dorso uncarinatum; sepalum inferius, subaequale, minus dorso bicarinatum; petala ligulata, basi undulata, apicem versus angustata, apice spatulata velutina lobulis pilosis hinc inde 2-3 in quovis petalo; labellum cuneatum canaliculatum unguiculatum sacco utrinque abrupto angulato; staminodium triangulum, antice bilobum, lobo utroque intus angulato, seu triangulo (nunc apiculo in fundo sinus) basi cornutum RCHB. F. — In Burmah legit Rév. PARISH.

*Cypripedium Parishii* RCHB. F. in *Flora*, 1869, 322; *Gard. Chron.*, 1869, p. 814; *Ill. Hort.*, 1875, t. 214; *Bot. Mag.*, t. 5791. — DE PUYDT, *Orch.* 188; *Orchidoph.*, 1897, t. 91. — HOOK. *Fl. Brit. Ind.*, VI, 174. — VEITCH *Man. Orch. Pl.*, IV, 41.

*Selenipedium Parishii* Rev. *Hort.*, 1885, 132.



ette belle espèce se distingue par son inflorescence multiflore et par la forme particulière de ses longs pétales enroulés et pendants. Elle a un cachet très distinct et fort attrayant, et il est un peu surprenant qu'elle ne soit pas plus répandue dans les cultures.

Elle fut découverte pour la première fois dans les Shan States, vers la frontière Sud-Est touchant au Moulmein, mais elle n'y est pas abondante, écrit le Rév. PARISH, et elle paraît l'être davantage plus au nord.

Le port de la plante a de l'analogie avec celui du *C. philippinense*; les feuilles sont distiques, largement loriformes, coriaces, obliquement obtuses au sommet, d'un vert foncé. La hampe florale, haute de 45 à 60 centimètres, un peu velue, porte quatre à six fleurs, accompagnées de grandes bractées vertes. Les sépales ovales, allongés en pointe, longs de 5 centimètres environ, sont vert pâle, striés de vert plus vif. Les pétales, longs de 10 à 13 centimètres, pendants, assez larges à la base, mais bientôt rétrécis, sont fortement enroulés. Leur coloris est un brun pourpré légèrement vineux, à part la base, qui est verte, striée de brun pourpré. Leurs bords sont ondulés et crispés, et portent de loin en loin des protubérances verruqueuses munies de cils assez longs. Le sabot est vert, lavé de brun clair ou parfois de brun pourpré foncé.

C'est une espèce épiphyte à l'état naturel.

Chose curieuse, le *C. Parishii*, malgré ses caractères si distincts, n'a guère été utilisé jusqu'ici par les semeurs. Il est vrai qu'il est rare dans les cultures. Le seul hybride issu de lui qui ait été montré jusqu'ici, à notre connaissance,

est le *Cypripedium* × *Wm. Trelease*, dont le second parent était le *C. Rothschildianum*. La Société Royale de Londres ne lui a pas décerné de récompense.

Notre planche a été exécutée d'après un exemplaire qui a fleuri dernièrement dans les serres du Parc Léopold.

