

LINDENIA  
ICONOGRAPHIE  
DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIÉE

PAR

LUCIEN LINDEN

17<sup>me</sup> VOLUME

7<sup>me</sup> DE LA SECONDE SÉRIE

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

1901

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.




CYPRIPEDIUM X AURIFERUM L. LIND.

PL. DCCLXXI

## CYPRIPEDIUM × AURIFERUM L. LIND.

## CYPRIPEDIUM DORÉ

CYPRIPEDIUM. Vide *Lindenia*, I, p. 17.*Cypripedium* × *auriferum*. Hybridum ex iisdem parentibus, e quibus *C.* × *Beeckmani*, ortum.*Cypripedium* × *auriferum* L. LIND., infra.

os lecteurs, et nous pouvons même dire d'une façon générale : les orchidophiles, ne peuvent avoir oublié le superbe *Cypripedium* × *Beeckmani*, dont nous avons publié le portrait dans le troisième volume de cette deuxième série; cet hybride fit sensation par son ampleur, par son magnifique coloris, et l'on peut ajouter : par le prix qu'il obtint, le plus élevé qui eût jamais été payé pour un *Cypripedium* hybride.

Celui dont nous publions le portrait ci-contre est issu du même croisement, de la même capsule de graines ! Il faut avoir constaté de visu cette communauté d'origine pour admettre le fait, qui semble à peine croyable. Encore une preuve, après tant d'autres, de l'extrême variabilité des hybrides, et tout particulièrement des *Cypripedium* hybrides. Il y a bien entre les deux fleurs une assez grande analogie de forme, et des traits communs qui rappellent notamment le *C. Boxalli*, l'un des parents, le seul, à vrai dire, qui soit connu d'une façon certaine; mais que de différences cependant, surtout dans le coloris ! Dans l'un, le pavillon était lavé de vert et très maculé de noir; c'est un caractère qui se retrouve chez beaucoup de descendants du *C. Boxalli*, chez le *C.* × *Adrastus* par exemple, et ses nombreuses variétés; ici, le vert est moins apparent, et le coloris foncé également; le noir est devenu du brun sombre, étalé, et non plus disposé en macules. Ces variations se présentent souvent dans la lignée du *C. Boxalli*.

D'autre part, différence beaucoup plus saillante, le rouge-marron intense qui donnait tant d'éclat aux pétales et au labelle du *C.* × *Beeckmani* ne se retrouve plus ici. Ces organes sont d'un coloris général jaune brillant, mélangé de brun orangé clair sur la moitié longitudinale supérieure des pétales.

Cette coloration jaune, si surprenante ici, nous donnerait à penser que le second parent, comme l'avaient proposé certains connaisseurs en 1897, pourrait bien être le *C. Sallieri*, dont l'influence ici aurait été prédominante. Le *C. Sallieri* est lui-même très variable, mais nous voulons parler plus spécialement de la variété *Hye anum*.

A titre de comparaison, il nous paraît intéressant de rappeler ici les hybrides qu'a déjà produits le *C. Sallieri*. Ce sont les suivants :

*C. × Angelae* (avec le *C. × Leeaanum*), qui présente des analogies assez marquées avec celui dont nous nous occupons ici (1899).

*C. × aureum*, *C. × Surprise*, *C. × Hebe*, *C. × Jeanne Voortman*, *C. × M<sup>me</sup> Marguerite Hye*, etc., avec le *C. Spicerianum*.

*C. × Charlesianum*, avec le *C. × Leeaanum* (1894).

*C. × Cobbianum*, avec le *C. Lawrenceanum*.

*C. × Colossus*, avec le *C. villosum giganteum*.

*C. × decorum*, avec le *C. Lawrenceanum*.

*C. × Erato*, avec le *C. hirsutissimum*.

*C. × Ganesa*, avec le *C. Lawrenceanum Hyeaanum*.

*C. × giganteum*, avec le *C. × Harrisianum*.

*C. × hirsutissimo-Sallieri*.

*C. × J. Howe*, avec le *C. villosum*.

*C. × lacteum*, identique avec le *C. × Angelae*.

*C. × leopardinum*, avec le *C. Argus*.

*C. × Leopoldianum*, avec le *C. hirsutissimum*.

*C. × Mahlerianum*, avec le *C. Boxalli*.

*C. × René*, avec le *C. × Harrisianum*.

*C. × Sampaianum*, avec le *C. insigne*.

*C. × Salliero-ciliolare*.

*C. × Talisman*, avec le *C. × Harrisianum*.

*C. × triumphans*, avec le *C. × ænanthum superbum*.

*C. × Troilus*, avec le *C. insigne Sanderæ*.

*C. × variable*, identique avec le *C. × Angelae*.

On voit, en somme, que la plupart de ces hybrides sont issus de deux ou trois croisements identiques ; et notamment les croisements avec le *C. Spicerianum* d'une part, avec le *C. × Leeaanum* d'autre part, ont donné des produits si différents entre eux que leurs obtenteurs ont pu leur attribuer plusieurs noms distincts ; dans le second cas, le nom de *C. × variable* a été adopté comme significatif.

Ajoutons qu'un des hybrides énumérés ci-dessus, le *C. × Howe*, a été croisé à son tour avec un autre, le *C. × Mrs. Charles Canham* ; il a produit le *C. × Cobbiae*.