

LINDENIA  
ICONOGRAPHIE  
DES ORCHIDÉES

DÉDIÉE A LA MÉMOIRE DE J. LINDEN

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIÉE

PAR

LUCIEN LINDEN

17<sup>me</sup> VOLUME

7<sup>me</sup> DE LA SECONDE SÉRIE

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

1901

GAND

IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS.





CYPRIPEDIUM × LATHAMIANUM RCHB. F. var. PRINCEPS HORT.



PL. DCCCVIII

CYPRIPEDIUM × LATHAMIANUM RCHB. f. var. PRINCEPS HORT.

CYPRIPÈDE M. W. LATHAM, var. SUPÉRIEURE

**CYPRIPEDIUM.** Vide *Lindenia*, I, p. 17.*Cypripedium* × *Lathamianum*. Vide *Lindenia*, IX, p. 29; cf. etiam *C. Lathamianum* var. *imperialis*, XVII, p. XV, pl. DCCLXXIV et var. *latissimum* HORT., pl. DCCXXXII.*C. Lathamianum* var. *princeps* HORT., infra.

ette forme assez bien caractérisée rappelle la plante que nous avons figurée, pl. DCCLXXIV, de cette série. La plante est relativement vigoureuse, à feuilles assez étalées, vertes, tachetées légèrement de violet à la base sur la face inférieure. Hampe florale rigide, velue, à poils rouges violacés et bractée florale environ aussi longue que l'ovaire. Sépale dorsal ou pavillon élargi, étalé, replié au sommet vers la ligne médiane, formant une sorte de bec; il est verdâtre dans sa partie inférieure, blanc dans sa partie supérieure, à nervure médiane large et violacée, à stries longitudinales violacées n'atteignant pas le sommet; sépale inférieur verdâtre, irrégulièrement strié de violet. Pétales étalés, plus ou moins falciformes, plus ou moins fortement ondulés sur les bords, divisés en deux parties par une ligne submédiane très colorée, au-dessus de la ligne le pétale est d'un rouge vineux sauf vers la base où le coloris assez uniforme se désagrège en ponctuation; au-dessous de la ligne, le pétale est jaunâtre, lavé de rouge vineux, à stries longitudinales colorées, plus ou moins marquées.

Le sabot est de belle forme, verdâtre dans sa partie inférieure, coloré en rouge vineux jusque vers le bord qui se détache en jaunâtre; l'intérieur est vernissé, d'un ton jaunâtre, lavé de rouge pourpre. Le staminode est violacé, muni d'un cône central jaune.

Comme nous le rappelions dans la note bibliographique en tête de ces lignes, REICHENBACH décrivit le *C. Lathamianum* dans la *Lindenia* sur des échantillons qui lui furent envoyés par W. B. LATHAM, du Jardin botanique de Birmingham, où la plante avait été obtenue en fécondant un *C. Spicerianum* par le pollen d'un *C. villosum* LINDL. (f. *Lindenia*, pl. CXXXII). Nous avons eu l'occasion de faire figurer antérieurement une très belle forme du même *Cypripedium*, à laquelle nous avons donné le nom de *latissimum*.

La plante que nous figurons ce jour, nous semble supérieure encore à la variété *latissimum* et à la variété *imperialis*; elle se fait surtout remarquer par la jolie forme de son pavillon admirablement coloré et par la belle

disposition des pétales dont la disposition rappelle toujours celle des pétales des beaux spécimens de *C. villosum*.

Le croisement *C. Spicerianum* × *villosum* a déjà fourni un certain nombre d'hybrides intéressants parmi lesquels on peut citer : *C. Albert Hye*, *C. Bellona*, *C. B. Celleni*, *C. M<sup>me</sup> Descombes*.

On a également obtenu en croisant *C. Spicerianum magnificum* par *villosum aureum*, une très jolie variété *albescens* qui se caractérise par son sépale dorsal d'un blanc pur sur la plus grande partie de sa surface.

Le croisement inverse *C. villosum* × *Spicerianum* a produit un hybride ressemblant beaucoup au *C. Lathamianum*, mais s'en différenciant par le coloris plus accentué du sépale dorsal.

Les plantes parents sont d'ailleurs des espèces excellentes qui pourront par un croisement entre pieds de bonne venue donner peut être encore d'excellentes choses.

---

#### CYPRIPEDIUM FAIRRIEANUM

Cette charmante petite Orchidée, originaire des Indes anglaises, a fait sa réapparition en Europe depuis un peu plus d'un an; elle avait disparu des cultures où elle avait cependant laissé d'excellents souvenirs.

La culture de cette espèce mérite d'être entreprise non-seulement pour elle-même, mais encore pour l'hybridation; elle a déjà donné des hybrides curieux et en donnera certainement beaucoup d'autres encore.

Mais à peine introduite, voilà qu'on signale déjà dans les plantes nouvelles venues de nombreuses variations, non-seulement quant à la grandeur des éléments floraux, mais encore quant à la forme et au coloris.

Une des fleurs cultivées à Ashlands, Newchurch, par M. R. ASHWORTH, possédait, d'après une note parue dans un des derniers fascicules de l'*Orchid Review*, près de 4 1/2 centimètres de diamètre; une autre est de dimensions plus réduites, mais plus fortement réticulée de pourpre; une troisième est plus différente, les pétales ont perdu la courbure caractéristique du type, ils sont presque à angle droit, à peine recourbés, le sépale inférieur est en forme et en grandeur, analogue au sépale supérieur.

Il est certain que parmi nos correspondants, plusieurs possèdent cette jolie Orchidée; nous serons heureux d'enregistrer les remarques qu'il pourraient faire sur la floraison de ce type si curieux.

---