

LE
JOURNAL DES ORCHIDÉES
GUIDE PRATIQUE DE CULTURE
RÉDIGÉ ET PUBLIÉ
PAR
LUCIEN LINDEN

Administrateur-Directeur de « L'Horticulture Internationale »
Secrétaire de « L'Orchidéenne »

AVEC LA COLLABORATION DE MM. :

J. LINDEN, Comte du BUYSSON, de LANSBERGE, G. WAROCQUÉ, Comte de MORAN,
MAX GARNIER, ÉM. RODIGAS, FUNCK, A. COGNIAUX, G. JORIS,
E. ROMAN, A. VAN IMSHOOT, FR. DESBOIS, Dr G. von HEERDT, E. BERGMAN, E. S. RAND,
CH. VAN WAMBEKE, A. BLEU, Dr VAN CAUWELAERT,
E. BUNGEROTH, CH. VASSEUR, Comte de BOUSIES, J. NÖTZLI, CAHUZAC, Dr CAPART,
JAMES O'BRIEN, G. MANTIN, J. DU TRIEU DE TERDONCK, O. DE KIRCHSBERG,
Vicomte de NOVION, G. TRUFFAUT, D. TREYERAN, G. RIVOIS, J. HATOS, P. SILVER,
A. DUCOS, A. DALLIÈRE, PAUL OTLET, F. KEGELJAN, O. BALLIF,
R. JOHNSON, C. ELLNER, CH. DE BOSSCHERE, A. HUBERT, A. DE LA DEVANSAYE, FL. CLAES,
DE MEULENAERE, F. DELLA PORTA, G. DIRETTI,
A. VAN DEN HEDE, SIESMAYER, A. WINCQZ, G. KITTEL, Baron de MEYLHAND,
et les Chefs de Culture de « L'HORTICULTURE INTERNATIONALE. »

4^{me} ANNÉE. — 1893

GAND
IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN, RUE DES CHAMPS

MDCCXCIII

4^{me} année.

15 AVRIL 1893

Numéro 75.

LE

JOURNAL DES ORCHIDÉES

GUIDE PRATIQUE DE CULTURE

RÉDIGÉ ET PUBLIÉ

PAR

LUCIEN LINDEN

Administrateur-Directeur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
Secrétaire de L'ORCHIDÉENNE

AVEC LA COLLABORATION DE MM.

J. Linden, Comte du Buysson, de Lansberge, G. Warocqué, Comte de Moran,
Max Garnier, Ém. Rodigas, Funck, A. Cogniaux, G. Joris, E. Roman,
A. Van Imschoot, Fr. Desbois, Dr G. von Heerdt, E. Bergman, E. S. Rand,
A. Bleu, Dr Van Cauwelaert, E. Bungeroth, Ch. Vasseur, J. Nötzli,
Comte de Bousies, R. Cahuzac, Dr Capart, James O'Brien, G. Mantin,
J. du Trieu de Terdonck, O. de Kirchsberg, Vicomte de Novion,
D. Massange de Louvrex, G. Rivois, J. Hatos, P. Silver, A. Ducos, A. Dallière,
Paul Otlet, F. Kegeljan, O. Ballif, R. Johnson, C. Ellner, J. Tonel, Ch. de Bosschere,
A. de la Devansaye, Fl. Claes, de Meulenaere, F. della Porta,
G. Directti, A. van den Heede, Siësmayer, A. Wincqz, G. Kittel, Baron de Meylandt,
et les Chefs de Culture de « L'Horticulture Internationale. »

Prix de l'Abonnement : 10 francs par an
POUR TOUTE L'UNION POSTALE

Parait le 1^{er} et le 15 de chaque mois

ON S'ABONNE

AU BUREAU DU JOURNAL; 100, RUE BELLIARD, A BRUXELLES

Dépositaire pour la France : M. O. DOIN, Éditeur,
8, Place de l'Odéon, PARIS.

Gand, impr. Eug. Vanderhaeghen.

tordu en crochet comme support, tels sont tous les préparatifs nécessaires. Toutefois les amateurs qui voudraient cultiver quelques Orchidées de cette façon sont quelquefois arrêtés, comme nous avons eu l'occasion de le constater, par la difficulté d'arroser ces plantes à la hauteur où elles se trouvent.

Voici un procédé extrêmement simple qui est employé à l'HORTICULTURE INTERNATIONALE et qui permet aux jardiniers d'arroser toutes les plantes de la façon la plus complète.

On se sert pour cela d'un instrument formé d'un bâton surmonté d'un cylindre; le cylindre sera en verre ou en zinc, creux, d'un diamètre assez grand pour que les pots puissent s'y enfoncer aisément; on le remplit d'eau, et le jardinier, tenant le bâton des deux mains comme un allumeur de réverbères tient sa lance (c'est une comparaison peu élégante, mais topique) va d'un pot à l'autre en élevant son cylindre pour que le pot et la plante baignent dans l'eau. En quelques minutes, une rangée de vingt mètres de longueur est arrosée, et cela de la manière la plus rationnelle; le compost est entièrement imbibé, et pas un coin ne reste sec.

Le cylindre doit avoir une certaine profondeur, pour qu'on ne soit pas obligé de le remplir d'eau à chaque instant; mais il va sans dire qu'il ne doit pas non plus être trop lourd; les dimensions employées à L'HORTICULTURE INTERNATIONALE, pour des pots de 9 centimètres, en moyenne, sont : 13 centimètres de diamètre et 26 de profondeur; l'appareil ainsi formé est de maniement extrêmement facile. Nous en publierons un dessin prochainement.

L. L.

LES CYPRIPÉDIÉES

Le nombre des Cypripèdes hybrides qui apparaissent actuellement dans tous les pays où la culture des Orchidées est en vogue, devient légion. A combien de ces hybrides pourra-t-on appliquer les strophes de Malherbe :

Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.

Combien de ces nouvelles obtentions resteront confinées dans quelques collections privilégiées ou seront même ignorées de la majeure partie des orchidophiles! Cependant il nous a paru intéressant de poursuivre le travail sur les

Cypripidiées, que nous avions commencé dans les premiers volumes de la *Lindenia* et qui a été continué dans le second volume du *Journal des Orchidées*.

En attendant la révision et la publication d'un nouveau travail, lequel comprendra toutes nos précédentes listes, nous nous sommes efforcés de noter, non seulement les noms de tous les Cypripèdes hybrides et d'introduction récente, présentés aux divers meetings horticoles, mais aussi ceux que les journaux horticoles de tous pays ont signalés.

Comme dans les listes précédentes, nous avons fait précédé d'un astérisque les Cypripèdes appartenant au groupe de *Selenipedium* et de deux les espèces à feuillage caduc et annuel.

- | | |
|---|---|
| C. Adrastus, hybr. | C. Burberryanum, hybr. |
| C. Leeannum \times C. Boxallii. | C. Boxallii \times C. plunerum. |
| Cypripedium Aeson, hybr. | C. callosum, var. viridiflorum. |
| C. insigne \times C. Druryi. | C. Ceres, hybr. |
| C. Albertianum, hybr. | C. Spicerianum \times C. hirsutissimum. |
| C. insigne Wallacei \times C. Spicerianum. | C. Chamberlainianum. Nouvelle Guinée. |
| C. Alcides superbum, hybr. | C. Chamberlainianum, var. platytaenium. |
| C. insigne Maulei \times C. hirsutissimum. | *C. chlorops, hybr. |
| C. Alfred Bleu, hybr. | S. Hartwegi \times S. Schlimi. |
| C. ciliolare \times C. insigne Chantini. | *C. chrysocomes, hybr. |
| C. Annaerti, hybr. | S. caudatum roseum \times S. conchiferum. |
| C. insigne \times C. Ashburtoniae. | C. Claudi, hybr. |
| C. Annamense. Indes. | C. Spicerianum \times C. vernixium. |
| C. Appletonianum. Bornéo. | *C. Cleola, hybr. |
| C. Arete, hybr. | S. Schlimi album \times S. reticulatum. |
| C. concolor \times C. Spicerianum. | C. Cleopatra, hybr. |
| C. Arthurianum pulchellum, hybr. | C. Hookerae \times C. oenanthum superbum. |
| C. insigne Chantini \times C. Fairieanum. | C. Clovenfordsi, hybr. |
| *C. Baconis, hybr. | C. Veitchi \times C. laevigatum. |
| S. chlorops \times S. Schlimi. | *C. compactum, hybr. |
| C. Barteti angustum, hybr. | C. Sedeni candidulum \times C. calurum. |
| C. barbatum Warneri \times C. insigne Kimballianum. | C. conco-Lawre, hybr. |
| C. bijou, hybr. | C. concolor \times C. Lawrenceanum. |
| C. oenanthum \times C. Lawrenceanum. | C. Constableanum, hybr. |
| C. Bosscherianum, hybr. | C. Fairieanum \times C. Dayanum. |
| C. Spicerianum \times C. barbatum superbum. | C. corbeillensis, hybr. |
| C. Bryani, hybr. | C. Bulleni \times C. insigne. |
| C. Argus \times C. Philippinense. | C. Corningianum, hybr. |
| *C. Brysa, hybr. | C. superciliare \times C. philippinense. |
| S. Sedeni candidulum \times S. Boisierianum. | C. Cowleyanum, hybr. |
| | C. Curtisi \times C. niveum. |

- C. Creon, hybr.
C. oenanthum superbum × *C. Harrisianum superbum*.
- C. Cybele, hybr.
C. Druryi × *C. Lawrenceanum*.
- C. Daisya, hybr.
C. oenanthum superbum × *C. Lowi*.
- C. decorum, hybr.
C. Sallieri Hyeanum × *C. Lawrenceanum*.
- C. Dibdin, hybr.
C. Argus × *C. Boxalli*.
- C. Edith Winn, hybr.
C. Stonei × *C. purpuratum*.
- C. Enfieldense, hybr.
C. Lawrenceanum × *C. Hookerae*.
- C. ensign, hybr.
C. Harrisianum × *C. barbatum Crossi*.
- C. Ephialtes, hybr.
C. insigne Chantini × *C. auroreum*.
- C. Erato, hybr.
C. Sallieri × *C. hirsutissimum*.
- C. Eucharis, hybr.
C. insigne Chantini × *C. Lawrenceanum*.
- C. Eurylochus, hybr.
C. ciliolare × *C. hirsutissimum*.
- C. Evenor, hybr.
C. Argus × *C. bellatulum*.
- C. exul. Siam.
C. exul var. *Imschootianum*.
- C. festum, hybr.
C. chloroneurum × *C. barbatum Warneri*.
- C. Gaskellianum, hybr.
C. Spicerianum × *C. Fairieanum*.
- C. gigas, hybr.
C. Lawrenceanum × *C. Harrisianum nigrum*.
- C. Godefroyae, var. luteum.
- C. Greyanum, hybr.
C. ciliolare × *C. Druryi*.
- *C. Hardyanum, hybr.
S. caudatum × *S. Ainsworthi*.
- C. Harrisianum, var. roseum, hybr.
C. barbatum Warneri × *C. villosum*.
- C. Hebe, hybr.
C. Spicerianum × *C. Stonei*.
- C. Hecla, hybr.
C. superbiens × *C. Swanianum*.
- **C. Henryi. Chine.
- C. Huybrechtsianum, hybr.
C. hirsutissimum × *C. Spicerianum*.
- C. Ianthe, hybr.
C. Harrisianum × *C. venustum*.
- C. imperiale. Bornéo.
- C. insigne, var. siamense.
- C. Johnesianum, hybr.
C. nitens superbum × *C. Lawrenceanum*.
- C. Josephinianum, hybr.
C. javanico-superbiens × *C. Druryi*.
- C. Juno, hybr.
C. Fairieanum × *C. callosum*.
- C. Jupiter, hybr.
C. Boxalli atratum × *C. hirsutissimum*.
- C. Kerchovianum, hybr.
C. Curtisi × *C. barbatum nigrum*?
- C. La France, hybr.
C. nitens × *C. niveum*.
- C. Lawrebellum hybr.
C. Lawrenceanum × *C. bellatulum*.
- C. Leda, hybr.
C. Harrisianum × *C. venustum*.
- C. Leeananum pulchellum, hybr.
C. insigne Nilsoni × *C. Spicerianum*.
- C. Leonae, hybr.
C. insigne Chantini × *C. callosum*.
- C. leucocochilum, hybr. nat.
C. Godefroyae × *C. bellatulum*.
- C. Lowi, var. Volonteanum.
- C. Lucienianum superbum, hybr.
C. villosum × *C. bellatulum*.
- C. Lucie, hybr.
C. Lawrenceanum × *C. ciliolare*.
- C. luridum, hybr.
C. Harrisianum × *C. auroreum*.
- C. luteo-pictum.?

- C. lutescens, hybr.
 C. Spicerianum \times C. javanicum.
- C. Lynchianum, hybr.
 C. Spicerianum \times C. selligerum majus.
- C. Macfarlanei, hybr.
 C. callophyllum \times C. Spicerianum.
- *C. macrochilum, hybr.
 S. longifolium \times Uropodium Lindeni.
- C. maculatum, hybr.
 C. tonsum \times C. Leeicum.
- C. Mauritianum, hybr.
 C. Spicerianum \times C. Dauthieri.
- C. memoria Moensi, hybr.
 C. Spicerianum \times C. ?
- C. Mr Finet, hybr.
 C. callosum superbum \times C. Godfroyae.
- C. multicolor, hybr.
 C. superbiens \times C. Spicerianum.
- C. Murillo, hybr.
 C. Boxallii atratum \times C. Argus.
- C. Orion, hybr.
 C. concolor \times C. insigne.
- *C. Penelaus, hybr.
 S. caudatum Lindeni \times S. calurum.
- *C. Perseus, hybr.
 S. Lindleyanum \times S. Sedeni porphyreum.
- *C. Phaedra, hybr.
 S. Lindleyanum \times S. Sedeni candidulum.
- C. Pheres, hybr.
 C. insigne \times C. hirsutissimum.
- C. Pitcherianum, var. Williamsi, hybr.
 C. Harrisianum superbum \times C. Spicerianum magnificum.
- **C. pusillum. Californie.
 C. Séneateur Montefiore, hybr.
 C. marmorophyllum \times C. Spicerianum.
- C. Sibyrolense, hybr.
 C. Boxallii \times C. insigne.
- C. Southgatense, hybr.
 C. bellatulum \times ?
- C. Sphinx, hybr.
 C. Argus \times C. Boxallii.
- C. Stonei var. candidum.
- C. Swinburnei, hybr.
 C. insigne Maulei \times C. Argus Moensi.
- C. T. W. Bond, hybr.
 C. Swanianum \times C. hirsutissimum.
- C. Tacita, hybr.
 C. Measuresianum \times C. tonsum.
- C. Telemachus, hybr.
 C. Lawrenceanum \times C. niveum.
- C. The Gem, hybr.
 C. marmorophyllum \times C. insigne Chantini.
- C. Thorntonii, hybr.
 C. superbiens \times C. insigne.
- C. Tityus, hybr.
 C. oenanthum superbum \times C. Spicerianum.
- C. tortile. Indes néerlandaises.
- C. Van Imschootianum, hybr.
 C. callosum \times C. insigne Chantini.
- C. Van Molianum, hybr.
 C. Spicerianum \times C. hirsutissimum.
- C. violaceum, hybr.
 C. villosum \times C. hirsutissimum.
- C. Warocqueanum, hybr.
 C. barbatum Warneri \times C. Fairieanum.
- C. Warnero-superbiens, hybr.
 C. barbatum Warneri \times C. superbiens.
- C. Weathersianum, hybr.
 C. Leeicum superbum \times C. hirsutissimum.
- C. Zampa, hybr.
 C. hirsutissimum \times C. Leeicum superbum.

OTTO BALLIF.